

Ficha da espécie

Casearia sylvestris

Dados do registo na Flora Digital de Portugal

Imagem de capa

Espécie: Casearia sylvestris

Descritor: Sw.

Família: Salicaceae

Ordem: Malpighiales

Sub-classe: Magnoliopsida

Classe: Rosidae

Sub-divisão: Magnoliophytina (Angiospermae)

Divisão: Spermatophyta

Tipo Fisionómico: Microfanerófito

Distribuição Geral: Nativa dos bosques ombrófilos desde Cuba até Argentina

Nome Comum: Erva-de-teiú; Guaçatonga; Guassatonga; Chá-de-bugre; Guaçatunga-preto; Cafezeiro-do-mato; Pau-lagarto;

Habitat/Ecologia: Bosques neotropicais

Sinonímias: Casearia chlorophoroidea Rusby; Casearia celtidifolia de Vriese; Casearia caudata Uittien; Casearia carpinifolia Benth.; Casearia cambessedesii Eichler; Casearia benthamiana Miq.; Casearia attenuata Rusby; Casearia affinis Gardner in Hooker; Anavinga samyda C.F. Gaertn.; Casearia ekmanii Sleumer; Casearia formosa Urb.; Casearia herbert-smithii Rusby; Casearia lindeniana Urb.; Casearia lindeniana Briq.; Casearia lingua Cambess.; Casearia onacaensis Rusby; Casearia ovoidea Sleumer; Casearia parviflora Gmelin; Casearia parviflora Willd.; Casearia punctata Spreng.; Casearia samyda (C.F. Gaertn.) de Candolle; Casearia schulziana O.C. Schmidt; Casearia serrulata Sw.; Casearia serrulata J. Sieber ex Griseb.; Casearia subsessiliflora Lundell; Guidonia sylvestris (Sw.) Maza; Samyda parviflora (Willd.) Poir.; Samyda parviflora L.; Samyda sylvestris (Sw.) Poir.;

Época Floração: Julho - Agosto

No JB-UTAD: Não existente.

Colecção temática: Não pertence a nenhuma colecção.

Utilização e acesso



As informações constantes neste documentos foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD**. A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização da Flora Digital de Portugal em <http://jb.utad.pt/termos>.

Jardim Botânico UTAD: <http://jb.utad.pt>

JB no Facebook: <http://facebook.com/utadjb>