

Ficha da espécie

Dryopteris affinis subesp. *borreri* var. *borreri*

Dados do registo na Flora Digital de Portugal

Imagem de capa

Espécie: *Dryopteris affinis* subesp. *borreri* var. *borreri*

Descritor: (Lowe) Fraser-Jenkins

Subespécie: *borreri* (Newman) Fraser-Jenkins

Varietade: *borreri* (Newman) Fraser-Jenkins

Família: Dryopteridaceae

Ordem: Polypodiales

Sub-classe: Polypodiopsida (Filicopsida)

Classe: -

Sub-divisão: -

Divisão: Monilophyta (Pteridophyta)

Tipo Fisionómico: Hemicriptófito

Distribuição Geral: W, C e S Europa; NW África; N Turquia; Cáucaso; N Irão e Macaronésia

Nome Comum: Falso-feto-macho; Fentilha;

Habitat/Ecologia: Ripícola

Sinonímias: *Dryopteris borreri* Newman; *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott var. *borreri* Newman; *Dryopteris pseudo-mas* (Woll.) Holub et Pouzar; *Dryopteris pseudo-mas* (Woll.) Holub et Pouzar var. *borreri* (Newman) P. Cout.;

Época Floração: Maio - Novembro

No JB-UTAD: Não existente.

Colecção temática: Não pertence a nenhuma colecção.

Utilização e acesso



As informações constantes neste documentos foram compiladas pela equipa do **Jardim Botânico UTAD**. A utilização desta informação está regida pelos termos e condições gerais de utilização da Flora Digital de Portugal em <http://jb.utad.pt/termos>.

Jardim Botânico UTAD: <http://jb.utad.pt>

JB no Facebook: <http://facebook.com/utadjb>